

Eksamen MED1100-3_V19_KONT

Konsekvenser av den psykometriske analysen av resultatene for prim³/₄sensuren

Figuren nedenfor viser poengfordelingen (minimum, 25-prosentil, median, 75-prosentil, maximum) p  de ulike digitale eksamensoppgavene etter prim³/₄sensur og korreksjoner.

Etter korreksjoner var den gjennomsnittlige totalscoren for alle sp rsm l under ett 61.

F lgende sp rsm l ble fjernet helt fra sensuren (*opprinnelig* fasitsvar i gr nt):

Spørsmål 4.1.29 i oppgave OPPGAVE4:

Gjærsoppen *Candida* er hyppigste etiologi til soppinfeksjon på hud og slimhinner (trøske). Hvilket utsagn er mest korrekt?

- ✘ *Candida albicans* er hyppig årsak til invasive soppinfeksjoner i Norge
- ✘ *Candida trøske* i munnhulen behandles med flukonazol per oralt
- ✘ *Candida trøske* i munnhulen behandles med Canesten salve
- ✔ *Candida*-celler kan enkelt påvises ved "våtpreparat"

Gjennomsnittlig score var 14.
Spørsmålet var feil konstruert.

Spørsmål 4.1.30 i oppgave OPPGAVE4:

Hvilken av følgende sopp-artene er en vanlig årsak til trøske?

- ✘ *Aspergillus*
- ✘ *Blastomyces*
- ✘ *Candida albicans*
- ✘ *Cryptococcus*

Gjennomsnittlig score var 0.
Det var teknisk feil i spørsmålet.

Spørsmål 4.1.31 i oppgave OPPGAVE4:

De basale smittevernrutinene (standardtiltak) for håndtering av pasienter er utarbeidet for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner. Hvilket utsagn er mest korrekt?

- ✔ *Rutinene skal hindre smittespredning til og mellom pasienter*
- ✘ *Rutinene er ikke tilstrekkelig for å hindre smittespredning fra pasienter til helsepersonell, da benyttes de utvidede smittevernrutinene*
- ✘ *Rutinene er basert på prinsippet om at all ikke-intakt hud, slimhinner og aerosoler fra luftveiene kan inneholde smittestoffer*
- ✘ *Rutinene skal benyttes ved all pasientkontakt*

Gjennomsnittlig score var 14.
Spørsmålet var uheldig konstruert.