

Eksamensbesvarelse

Eksamensmeddelande

Fasit

Oppgave: MEDSEM5_HJERTE_V13_KONT

Del 1:

Pasienten er en 43 år gammel kvinne som i sin ungdom ble strølebehandlet pga. lymfom (kreft) og har kjent strøleskade i form av lett fibrose i lunger. I 2010 fikk hun innlagt 2-kammer pacemaker pga. synkope og AV-blokk grad 3. Hun ble hjesten 2012 innlagt på Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus pga. økende dyspnoe. Ved hjerteauskultasjon hadde hun en kraftig bløsende systolisk bilyd grad IV i området apex Ø v. axille som ikke var angitt i journal tidligere, og ved lungeauskultasjon spesielt mye knatrelyder basalt bilateralt. BT ble målt til 112/64 mmHg.

Spørsmål 1:

Hva viser EKG?

- Sinusrytmme, gammelt infarkt i nedre og fremre vegg
- Sinusrytmme og venstre grenblokk
- Akutt ST-hevningsinfarkt
- Pacemakerstimulering av høyre forkammer og hjertekammer
- Atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel
- Normalt EKG

Svar:

Atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel

Spørsmål 2:

Hva tror du ut fra sykehistorie og kliniske funn er årsaken til hennes økende dyspnoe? (2 linjer)

Svar:

Strølebehandling mot brystkassen i sykehistorien, tidligere innlagt pacemaker pga. skadet ledningssystem, nøy svår systolisk bilyd forenelig med mitralinsufficiens.

Spørsmål 3:

Kan det være sammenheng mellom hennes lungefibrose og hjertesykdom? (2 linjer)

Svar:

Strølebehandling har gitt lett lungefibrose og har også skadet hjerte både ledningssystemet og mitralklaffeapparatet - dvs. klar sammenheng.

Spørsmål 4:

Hvilke 2 undersøkelser vil du be om før gjort allerede innleggelsesdagen?

- Røntgen thorax front og side av støende pasient
- Koronar angiografi
- MR Cor
- Ekkokardiografisk undersøkelse
- Myokardperfusjonsscintigrafi

Arbeidsbelastning med EKG (AKG)

Svar:

Røntgen thorax front og side av stående pasient
Ekkokardiografisk undersøkelse

Del 2:

Pasienten er en 43 år gammel kvinne som i sin ungdom ble strålbehandlet pga. lymfom (kreft) og har kjent stråleskade i form av lett fibrose i lunger. I 2010 fikk hun innlagt 2-kammer pacemaker pga. synkope og AV-blokk grad 3. Hun ble hjesten 2012 innlagt på Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus pga. økende dyspnoe. Ved hjerteauskultasjon hadde hun en kraftig bløsende systolisk bilyd grad IV i området apex Ø v. axille som ikke var angitt i journal tidligere, og ved lungeauskultasjon spesielt mye knatrelodyder basalt bilateralt. BT ble målt til 112/64 mmHg. **EKG viste sinusrytme 78/min, tydelige P-bølger som er breddekket og to-puklet (P-mitrale), atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel. Hun hadde stuvning på røntgen thorax og stor mitralinsuffisiens på ekko cor.**

Spørsmål 1:

Hvorfor vil du gi henne diagnosen hjertesvikt? (2 linjer)

Svar:

Hun har både subjektive symptomer/funn (betydelig dyspnoe, kraftig bilyd) samt objektive funn (stuvning på rtg. thorax, mitralinsuffisiens på ekko cor)

Spørsmål 2:

Hvilke medikamenter i forsiktige doser kan det være aktuelt å starte med allerede første diagnostikk?

- Antiarytmisk behandling med amiodaron (Cordarone)
- Beta-blokade med metoprolol (Selozok)
- Slyng-(loop) diuretikum som furosemid (Diural, Furix) eller bumetanid (Burinex)
- Lipidsenkende behandling med statin
- Dobel platehemmende behandling med acetylsalisylsyre (Aspirin) og clopidogrel (Plavix)
- ACE-hemmer eller angiotensin-reseptorblokker (ARB)

Svar:

Beta-blokade med metoprolol (Selozok)
Slyng-(loop) diuretikum som furosemid (Diural, Furix) eller bumetanid (Burinex)
ACE-hemmer eller angiotensin-reseptorblokker (ARB)

Spørsmål 3:

Hvilken av følgende ekkokardiografiske beskrivelser er mest sannsynlig?

- Bicuspid aortaklaff med både stenose og insuffisiens
- Normale forhold ved ultralydundersøkelse av hjertet
- Sklerotisk mitralklaff med stor insuffisiens pga. restriksjon av bakre seil og signifikant stenose sekundært til sklerose i mitralapparatet
- Betydelig tricuspidal lekkasje pga. økt systolisk trykk i h. ventrikkel
- Gjennomgått moderat stort anteroseptalt infarkt og EF ca. 40 %

Svar:

Sklerotisk mitralklaff med stor insuffisiens pga. restriksjon av bakre seil og signifikant stenose sekundært til sklerose i mitralapparatet

Spørsmål 4:

Hvilken operativ hjertebehandling er mest aktuelt for denne pasienten?

- Mekanisk mitralventil og bypass til LAD og CX
- Biologisk mitralventil
- Kateterbasert sammenklemming av mitralapparatet (Mitralklipp)
- Mitralplastikk og ring i annulus
- Hjertekirurgi er uaktuelt pga. hennes lungefibrose

Svar:

Biologisk mitralventil

Del 3:

Pasienten er en 43 år gammel kvinne som i sin ungdom ble strølebehandlet pga. lymfom (kreft) og har kjent strøleskade i form av lett fibrose i lunger. I 2010 fikk hun innlagt 2- kammer pacemaker pga. synkope og AV-blokk grad 3. Hun ble høsten 2012 innlagt på Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus pga. økende dyspnoe. Ved hjerteauskultasjon hadde hun en kraftig bløsende systolisk bilyd grad IV i området apex Ø v. axille som ikke var angitt i journal tidligere, og ved lungeauskultasjon spesielt mye knatrelyder basalt bilateralt. BT ble målt til 112/64 mmHg. EKG viste sinusrytm 78/min, tydelige P-bølger som er brede og to-puklet (P-mitrale), atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel. Hun hadde stuvning på rettgen thorax og stor mitralinsuffisiens på ekko cor.

Hun fikk hjertesviktbehandling med diureтика, beta-blokker og ARB, og kom seg bra i løpet av noen få dager. Ekko cor viser etter hvert både insuffisiens og stenose i mitralklaffen, og den ble skiftet med en biologisk ventil.

Spørsmål 1:

ARBs gunstige virkninger ved hjertesvikt skyldes blant annet

- kning av hjertets kontraktsjonskraft
- Reduksjon av hjertets "preload"
- Reduksjon av hjertets "afterload"
 - kt hjertefrekvens
- Redusert hypertrofi av hjertet
 - kning av aldosteron

Svar:

Reduksjon av hjertets "preload"

Reduksjon av hjertets "afterload"

Redusert hypertrofi av hjertet

Spørsmål 2:

Hvilke pre-operative undersøkelser og vurderinger måtte rutinemessig gjennomføres?

- Undersøkelse ved tannlege og sanering av tannstatus
- Nyremedisinsk vurdering til tross for normal serum kreatinin
- Serologiske prøver inklusive HIV og hepatitt
- Vurdering av lungefunksjonen (spirometri)
- Graviditetstest
- Gangtest i oppmålt løype på korridoren

Svar:

Undersøkelse ved tannlege og sanering av tannstatus

Serologiske prøver inklusive HIV og hepatitt

Vurdering av lungefunksjonen (spirometri)

Spørsmål 3:

Etter operasjonen er det ikke aktuelt med hvilket av følgende undersøkelser eller tiltak?

- Rask mobilisering og flytting tilbake til Hjertemedisinsk sengepost senest 4. postop. dag
- Sykmelding i minst ett år slik at hun kan komme seg skikkelig
- Opphold på etterbehandlings- eller rehabiliteringscenter
- Trappe ned hjertemedisinene for å se om hun kan klare seg uten
- Ekkokardiografisk kontroll av ventilen under oppholdet for å se at operasjonen var OK

Svar:

Sykmelding i minst ett år slik at hun kan komme seg skikkelig

Spørsmål 4:

Pasienten har fått sin biologiske mitralventil, og før etter noen uker påvist episoder med plagsom rask atrieflimmer. Hvilken antiarytmisk behandling vil være 1. valg?

- Flekainid (Tambocor)
- Amiodarone (Cordarone)
- Beta-blokker som metoprolol (SeloZok)
- Beta-blokker kombinert med kalsium antagonist av typen verapamil eller diltiazem
- Ingen, ettersom episodene bare er paroksystisk

Svar:

Beta-blokker som metoprolol (SeloZok)

Del 4:

Pasienten er en 43 år gammel kvinne som i sin ungdom ble strålebehandlet pga. lymfom (kreft) og har kjent stråleskade i form av lett fibrose i lunger. I 2010 fikk hun innlagt 2-kammer pacemaker pga. synkope og AV-blokk grad 3. Hun ble hjelsten 2012 innlagt på Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus pga. bekende dyspnoe. Ved hjerteauskultasjon hadde hun en kraftig bløsende systolisk bilyd grad IV i området apex Ø v. axille som ikke var angitt i journal tidligere, og ved lungeauskultasjon spesielt mye knatrellyder basalt bilateralt. BT ble målt til 112/64 mmHg. EKG viste sinusrytm 78/min, tydelige P-bølger som er breddekt og to-puklet (P-mitrale), atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel. Hun hadde stuvning på røntgen thorax og stor mitralinsuffisiens på ekko.

Hun fikk hjertesviktbehandling med diureтика, beta-blokker og ARB, og kom seg bra i løpet av noen få dager. Ekko viser etter hvert både insuffisiens og stenose i mitralklaffen, og den ble skiftet med en biologisk ventil.

Etter operasjonen kom hun seg fort, ble utskrevet etter 10 dager og var tilbake i arbeid etter 3 mnd. Som eneste hjertemedisiner hadde hun warfarin (Marevan) og en liten dose metoprolol (SeloZok) pga. paroxysmal atrieflimmer.

Spørsmål 1:

Pasientene ble reinnlagt vinteren 2013, og var da noe medtatt, hadde høy feber og CRP 107 (normalt < 4 mg/L), men var ellers veken og klar. Hvilken differensialdiagnose er minst sannsynlig?

- Urinveisinfeksjon
- Virusinfeksjon
- Endokarditt
- Pneumoni
- Meningitt

Svar:

Meningitt

Spørsmål 2:

Hvilke av følgende undersøkelser vil du rekvirere for å utrede hennes febertilstand videre?

- Bakteriologisk undersøkelse av urin, ekspektorat, sørsekret etc.
- MRSA screening

CT eller MR caput
Ekkokardiografi før og etter klaffevegetasjoner
Gjentatte blodkulturer
Spinalpunksjon

Svar:

Bakteriologisk undersøkelse av urin, ekspektorat, sørsekret etc.
Ekkokardiografi før og etter klaffevegetasjoner
Gjentatte blodkulturer

Spørsmål 3:

Hvis det påvises endokarditt, hvilke tiltak nedenfor er indisert?

- Gjentatte ekkokardiografiske undersøkelse for å vurdere klaffefunksjon
- Fullheparinisering som ved ustabilt koronarsyndrom
- Umiddelbar gjennomsettelse av alle hjertemedisinene fra før klaffeoperasjonen
- Rask henvisning tilbake til hjertekirurgene for å klage på operasjonen
- Intravenøs antibiotika behandling etter resistensmønster i opptil 6 uker
- Monitorering av infeksjonsparametre (CRP, hvite

Svar:

Gjentatte ekkokardiografiske undersøkelse for å vurdere klaffefunksjon
Intravenøs antibiotika behandling etter resistensmønster i opptil 6 uker
Monitorering av infeksjonsparametre (CRP, hvite)

Spørsmål 4:

Pasientens CRP var synkende og hennes blodtrykk ble stadig målt til ca. 95-120 mmHg systolisk og 65-75 mmHg diastolisk. Velg Zn riktig beskrivelse nedenfor:

- Det kan gi mistanke om septikemi (øseptisk sjokk) og krever tett monitorering
- Det er farlig lavt og kan tyde på at hun igjen utvikler alvorlig hjertesvikt
- Det er helt normalt og sannsynligvis hennes habituelle BT
- Det er en skremmende stor variasjon og tyder egentlig på alvorlig BT sykdom
- Det er mest sannsynlig gjort slurvete målinger

Svar:

Det er helt normalt og sannsynligvis hennes habituelle BT

Del 5:

Pasienten er en 43 år gammel kvinne som i sin ungdom ble streebehandlet pga. lymfom (kreft) og har kjent stråleskade i form av lett fibrose i lunger. I 2010 fikk hun innlagt 2-kammer pacemaker pga. synkope og AV-blokk grad 3. Hun ble hjerten 2012 innlagt på Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus pga. økende dyspnoe. Ved hjerteauskultasjon hadde hun en kraftig bløsende systolisk blyd grad IV i området apex Ø v. axille som ikke var angitt i journal tidligere, og ved lungeauskultasjon spesielt mye knatrelodyer basalt bilateralt. BT ble målt til 112/64 mmHg. EKG viste sinusrytm 78/min, tydelige P-bølger som er breddekt og to-puklet (P-mitrale), atriestyrt pacemakerstimulering av høyre ventrikkel. Hun hadde stuvning på røntgen thorax og stor mitralinsuffisiens på ekko cor.

Hun fikk hjertesviktbehandling med diureтика, beta-blokker og ARB, og kom seg bra i løpet av noen få dager. Ekko viser etter hvert både insuffisiens og stenose i mitralklaffen, og den ble skiftet med en biologisk ventil.

Etter operasjonen kom hun seg fort, ble utskrevet etter 10 dager og var tilbake i arbeid etter 3 mnd. Som eneste hjertemedisiner hadde hun warfarin (Marevan) og en liten dose metoprolol (Selozok) pga. paroksismal atrieflimmer. Vinteren 2013 ble hun reinnlagt noe medtatt med høy feber, men det ble ikke påvist bakterieinfeksjon, og det ble etter hvert konkludert med at hun bare hadde hatt et uskyldig virus. Hennes BT var naturlig lavt.

Spørsmål 1:

Hvilke red vil du ikke gi når hun kommer til kontroll på poliklinikken noen mnd. senere?

- Du bør drive fysisk aktivitet, gjerne som hjertetrim eller på treningscenter

Reiser til utlandet er uproblematiske, men du bør ha med ditt pacemaker-ID-kort
Moderate mengder vin og alkohol er ikke relatert til hjerte/kar sykdom
Forsøk å overbevise din mann om å slutte å røyke Ø selv passiv røyking kan være skadelig
Du kan leve et normalt samliv
Din tannstatus betyr ikke lite og du trenger ikke lenger besøke tannlegen Ørlig

Svar:

Din tannstatus betyr ikke lite og du trenger ikke lenger besøke tannlegen Ørlig

Spørsmål 2:

Pasienten har da følgende ja/nei spørsmål til deg:

Kan jeg kjøre bil som før?

Er det ellers helt trygt å reise på lange flyturer?

Bør jeg bruke lavmolekylært heparinsprøyter (Fragmin, Klexane) ved flyturer?

Er noen av mine sykdommer arvelige?

Før jeg fortsatt regelmessig oppfølging på pacemakerlaboratoriet?

Blir jeg rutinemessig innkalt til ekko kardiografisk kontroll om et år?

Svar:

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Spørsmål 3:

Hennes mann er et par år eldre, har røkt i mange år, men er ellers frisk. Hun forteller at han de siste uker har merket økende klem for brystet ved gange i motbakker. Hvilken hjelpe eller råd vil du som lege på Hjerteavdelingen få gi:

Ta initiativ til at han raskt får time til arbeids EKG (AKG) på poliklinikken

Be dem ta kontakt med familiens fastlege, som kan vurdere plagene om noen uker ikke det er ledig time og henvise om nødvendig

Be henne berolige ektemannen og forklare at det hele sikkert bare er uskyldig stress

Svar:

Ta initiativ til at han raskt får time til arbeids EKG (AKG) på poliklinikken

Spørsmål 4:

Familiens sitasjon blir etter hvert avklaret. De er velstøttende, og oppsøker deg meget takknemlige på kontoret med forslag om en større gave eller donasjon. Du vurderer åne av nedenstående muligheter:

I offentlig tjeneste med fast lønn og uten bonusordning er det greit å ta imot dette personlig

Du henviser dem til sekretær som privat kjenner en økonomikonsulent på en annen avdeling som har funnet en innbetalingskonto ved sykehuset som gir at midlene til slutt overføres til avdelingens forskningskonto

Du søker avdelingsledelsen om samtykke til at midlene kan mottas til forskningskonto

Du ber om at dette settes inn på personalets private konto for sosiale tiltak utenfor avdelingen

Du takker nei til tilbudet med begrunnelse av at sykehuset ikke kan motta donasjoner

Du avviser tilbuddet nokså bryskt og ber dem gi midlene til et veldedig formål utenfor sykehuset

Svar:

Du søker avdelingsledelsen om samtykke til at midlene kan mottas til forskningskonto

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V13_KONT

Del 1:

Du er turnuskandidat på et kommunelegekontor og blir oppsøkt av en 59 år gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, ført dørlig matlyst og tiltagende hoste, særlig sist døgn. Rustfarget ekspektorat. Hun angir også litt stikkende smerter under høyre axille når hun hoster. Fra før har hun vært frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2 år tidligere. Hun røyker anslagsvis 10-15 sigarettar daglig.

Du undersøker henne klinisk og finner at hun har øretemperatur 38,5 °C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lungegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig Ø BMI 33,5 kg/m². På høyre side hører du spredte inspiratoriske knatrelyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes).

Spørsmål 1:

Tentativ diagnose?

Svar:

Pneumoni

Spørsmål 2:

Vil du legge henne inn på sykehus?

Ja
Nei

Svar:

Nei

Spørsmål 3:

Vil du gi henne medikamentell behandling?

Ja
Nei

Svar:

Ja

Del 2:

Du er turnuskandidat på et kommunelegekontor og blir oppsøkt av en 59 år gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, ført dørlig matlyst og tiltagende hoste, særlig sist døgn. Rustfarget ekspektorat. Hun angir også litt stikkende smerter under høyre axille når hun hoster. Fra før har hun vært frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2 år tidligere. Hun røyker anslagsvis 10-15 sigarettar daglig. Du undersøker henne klinisk og finner at hun har øretemperatur 38,5 °C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lungegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig Ø BMI 33,5 kg/m². På høyre side hører du spredte inspiratoriske knatrelyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes). Du tror pasienten har en høyresidig pneumoni og vil starte behandling med penicillin. Pasienten forteller da at hun har penicillin-allergi. Du stiller henne noen tilleggsspørsmål om dette.

Spørsmål 1:

Hvilket utsagn er avgjørende for ditt valg av behandling?

Hun har tidligere ført kløende utslett på magen av penicillin
Hun før tynn avføring/diare av penicillin
Hun før hodepine av penicillin
Hun har ført magesmerter av penicillin

Hun sier penicillin smaker vondt

Svar:

Hun har tidligere fått kløende utslett på magen av penicillin

Spørsmål 2:

Hvordan virker penicillin?

- Hemmer proteinsyntesen i bakteriene
 - delegger cellemembranen til bakteriene
 - Hemmer celleveggsyntesen til bakteriene
 - delegger cellekjernen til bakteriene
 - Stopper metabolismen til bakteriene

Svar:

Hemmer celleveggsyntesen til bakteriene

Spørsmål 3:

Du tror pasienten kan ha penicillin-allergi og velger å behandle henne med etrytromycin 0,5 gx2. Hvilke klasse antibiotika hører erytromycin til?

- Beta-laktam antibiotika
- Tetrasykliner
- Sulfonamider
- Makrolider
- Aminoglykosider

Svar:

Makrolider

Spørsmål 4:

Hva er den hyppigste bivirkningen av erytromycin?

- Magesmerter
 - resus
- Dobbeltsyn
- Parestesier
- Tap av hukommelsen

Svar:

Magesmerter

Del 3:

Du er turnuskandidat på et kommunelegekontor og blir oppsøkt av en 59 år gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, fått dørlig matlyst og tiltagende hoste, særlig siste dag. Rustfarget ekspektorat. Hun angir også litt stikkende smerte under høyre axille når hun hoster. Fra før har hun vært frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2 år tidligere. Hun røyker anslagsvis 10-15 sigaretter daglig. Du undersøker henne klinisk og finner at hun har øretemperatur 38,5 °C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lungegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig med BMI 33,5 kg/m². På høyre side hører du spredte inspiratoriske knatrelodyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes). Du tror pasienten har en høyresidig pneumoni og vil starte behandling med penicillin. Pasienten forteller da at hun har penicillin-allergi. Du stiller henne noen tilleggsspørsmål om dette.

Pasienten kommer tilbake etter fem dager og forteller at hun ikke er blitt nevneverdig bedre. Hun får i seg lite mat, er fortsatt slapp og melder rektaltemperatur 39,0 °C fra sengetid siste dag. Du perkuterer og auskulterer lungene hennes og finner at lungegrensen er høyere på høyre enn venstre side, ellers uforandret. Din hurtigtest på CRP viser nivå > 100 mg/L. Du får tatt røntgen thorax, se nedenfor.

Spørsmål 1:

Dersom du blir bedt om framheve det viktigste funnet, hva velger du da? (max 1 linje)

Svar:

Utfylt høyre sinus. Noen studenter vil kanskje si "fortetning", men med en fortetning mener en at lesjonen sitter i lungevevet. Denne sitter høyst sannsynlig utenfor, f.eks pleuravæske, dvs. "fortetning" kan ikke godtas som riktig svar (eventuelt max 1 poeng?).

Spørsmål 2:

Hva er den mest sannsynlige forklaringen på røntgen-funnet? (1 ord)

Svar:

Pleuravæske

Del 4:

Du er turnuskandidat på et kommunelegekontor og blir oppsøkt av en 59 år gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, følt dørlig matlyst og tiltagende hoste, særlig siste dag. Rustfarget ekspektorat. Hun angir også litt stikkende smerte under høyre axille når hun hoster. Fra før har hun vært frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2 år tidligere. Hun røyker anslagsvis 10-15 sigarettar daglig. Du undersøker henne klinisk og finner at hun har øretemperatur 38,5 °C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lunegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig Ø BMI 33,5 kg/m². På høyre side hører du spredte inspiratoriske knatrelodyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes). Du tror pasienten har en høyresidig pneumoni og vil starte behandling med penicillin. Pasienten forteller da at hun har penicillin-allergi. Du stiller henne noen tilleggsspørsmål om dette.

Pasienten kommer tilbake etter fem dager og forteller at hun ikke er blitt nevneverdig bedre. Hun føler i seg lite mat, er fortsatt slapp og melder rektaltemperatur 39,0 °C før sengetid siste dag. Du perkuterer og auskulterer lungene hennes og finner at lunegrensen er høyere på høyre enn venstre side, ellers uforandret. Din hurtigtest på CRP viser nivå > 100 mg/L. Du føler tatt røntgen thorax.

Røntgen thorax viser en utfylling av høyre sinus, og pasienten blir lagt inn på sykehus. Ved ankomst sykehuset viser blodprøver: hemoglobin 12,3 g/dL (11,7-15,3); leukocytter 9,7x10⁹/L (3,7-8,8); CRP 350 mg/L (<5); glukose 10,1 mmol/L (4,0-6,0); LD 160 U/L (105-205). Arteriell blodgass i romluft viser pH 7,48 (7,35-7,45); PaCO₂ 4,0 kPa (5,0-6,0); PaO₂ 7,6 kPa (>10). Thoraxfunnet er forenlig med pleuravæske.

Spørsmål 1:

Hva er den mest sannsynlige diagnosen nå?

Svar:

(Pleura)empyem.

Spørsmål 2:

Blodgassverdiene er forenlig med

- Akutt respirasjonssvikt type 1
- Akutt respirasjonssvikt type 2
- Hyperventilasjon
- Kronisk respirasjonssvikt type 1

Kronisk respirasjonssvikt type 2

Svar:

Akutt respirasjonssvikt type 1
Hyperventilasjon

Spørsmål 3:

Hva vil du n  prioritere i gj re? (max 1 linje)

Svar:

Pleurapunksjon og tapping

Spørsmål 4:

Hvilke pr ver vil du ta i tillegg til blodpr vene som er nevnt ovenfor? (max 2 linjer)

Svar:

Sende pleurav ske til klinisk kjemisk, mikrobiologisk og cytologisk unders kelse. Blodkultur kan godtas, men erstatter ikke de tre f rste. Utdyping av de tre f rste punktene er fint, men ikke n dvendig for full uttelling.

Del 5:

Du er turnuskandidat p  et kommunelegekontor og blir opps kt av en 59  r gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, f tt d rlig matlyst og tiltagende hoste, s rlig siste d gn. Rustfarget ekspektorat. Hun angir ogs  litt stikkende sm ter under h yre axille n r hun hoster. Fra f r har hun v rt frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2  r tidligere. Hun r yker anslagsvis 10-15 sigaretter daglig. Du unders ker henne klinisk og finner at hun har  rettemperatur 38,5  C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lungegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig   BMI 33,5 kg/m . P  h yre side h rer du spredte inspiratoriske knatreyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes). Du tror pasienten har en h residig pneumoni og vil starte behandling med penicillin. Pasienten forteller da at hun har penicillin-allergi. Du stiller henne noen tilleggssp rsm l om dette.

Pasienten kommer tilbake etter fem dager og forteller at hun ikke er blitt nevneverdig bedre. Hun f r i seg lite mat, er fortsatt slapp og m lte rektaltemperatur 39,0  C f r sengetid siste d gn. Du perkuterer og auskulterer lungene hennes og finner at lungegrensen er h tere p  h yre enn venstre side, ellers uforandret. Din hurtigtest p  CRP viser n  > 100 mg/L. Du f r tatt r ntgen thorax.

R ntgen thorax viser en utfyllning av h yre sinus, og pasienten blir lagt inn p  sykehus. Ved ankomst sykehuset viser blodpr ver: hemoglobin 12,3 g/dL (11,7-15,3); leukocytter $9,7 \times 10^9/L$ (3,7-8,8); CRP 350 mg/L (<5); glukose 10,1 mmol/L (4,0-6,0); LD 160 U/L (105-205). Arteriell blodgass i romluft viser pH 7,48 (7,35-7,45); PaCO₂ 4,0 kPa (5,0-6,0); PaO₂ 7,6 kPa (>10). Thoraxfunnet er forenlig med pleurav ske.

Det tappes ut v ske fra h yre pleurahule. V sken som kommer ut er gul og blakk. Kjemisk analyse viser pH 7,00; leukocytter $> 190 \times 10^9/L$; total protein 59 g/L; LD > 800 U/L.

Spørsm l 1:

Representerer denne pleurav skens et eksudat?

Ja
Nei

Svar:

Ja

Spørsm l 2:

eller representerer den et transudat?

Ja
Nei

Svar:

Nei

Spørsmål 3:

Pleura eksudater er karakterisert ved

Pleura-leukocytter > blod-leukocytter

Pleura-pH > 7,20

Blakket pleuravæske

Pleura total protein > 30 g/L

Pleura-LD > 2/3 serum-LD

Svar:

Pleura total protein > 30 g/L

Pleura-LD > 2/3 serum-LD

Spørsmål 4:

Hvilke to behandlingstiltak vil du prioritere nedenfor?

Svar:

1) Legge inn dren (4 poeng), 2) I.v antibiotika (2 poeng)

Spørsmål 5:

På tross av tiltakene dine faller ikke CRP under 150 mg/L og pasienten virker fortsatt syk.

Hva gjør du nedenfor? (max 1 linje)

Svar:

Konfererer en kirurg

Del 6:

Du er turnuskandidat på et kommunelegekontor og blir oppsøkt av en 59 år gammel kvinne. Kvinnen forteller at hun de siste dagene er blitt tiltagende slapp, følt dørlig matlyst og tiltagende hoste, særlig siste dagene. Rustfarget ekspektorat. Hun angir også litt stikkende smerte under høyre axille når hun hoster. Fra før har hun vært frisk bortsett fra diabetes type 2, som ble diagnostisert 2 år tidligere. Hun røyker anslagsvis 10-15 sigaretter daglig. Du undersøker henne klinisk og finner at hun har rettemperatur 38,5 °C, puls 80/min, blodtrykk 145/85 mmHg, sidelike og normale lungegrenser. Respirasjonsfrekvens 20/min. Hun er moderat overvektig med BMI 33,5 kg/m². På høyre side hører du spredte inspiratoriske knatrelyder. CRP hurtigtest 50-100 mg/L (<5), (referanseverdi i parentes). Du tror pasienten har en høyresidig pneumoni og vil starte behandling med penicillin. Pasienten forteller da at hun har penicillin-allergi. Du stiller henne noen tilleggsspørsmål om dette.

Pasienten kommer tilbake etter fem dager og forteller at hun ikke er blitt nevneverdig bedre. Hun føler i seg lite mat, er fortsatt slapp og melder rektaltemperatur 39,0 °C fra sengetid sistes dagene. Du perkuterer og auskulterer lungene hennes og finner at lungegrensen er høyere på høyre enn venstre side, ellers uforandret. Din hurtigtest på CRP viser nedenfor 100 mg/L. Du føler tatt røntgen thorax.

Røntgen thorax viser en utfyllning av høyre sinus, og pasienten blir lagt inn på sykehus. Ved ankomst sykehuset viser blodprøver: hemoglobin 12,3 g/dL (11,7-15,3); leukocytter 9,7x10⁹/L (3,7-8,8); CRP 350 mg/L (<5); glukose 10,1 mmol/L (4,0-6,0); LD 160 U/L (105-205). Arteriell blodgass i romluft viser pH 7,48 (7,35-7,45); PaCO₂ 4,0 kPa (5,0-6,0); PaO₂ 7,6 kPa (>10). Thoraxfunnet er forenlig med pleuravæske.

Det tappes ut væske fra høyre pleurahule. Væskens som kommer ut er gul og blakk. Kjemisk analyse viser pH 7,00; leukocytter > 190x10⁹/L; total protein 59 g/L; LD > 800 U/L.

Det viser seg at pasienten har et empyem, men blir ikke helt bra selv om det legges inn dren og pasienten får antibiotika (cefotaxim) i.v. Du konfererer en kirurg. Kirurgen velger å rense thorashulen for fibrinbelegg og puss thorakoskopisk. Pasienten kommer seg fint i løpet av neste uke og utskrives.

Spørsmål 1:

Ved utskrivenheten gjør du følgende avtal med pasienten

- Kontroll unødvendig
- Kontroll hos egen lege
- Kontroll på poliklinikken med rtg.thorax, bl-leukocytter og CRP

Svar:

Kontroll på poliklinikken med rtg.thorax, bl-leukocytter og CRP

Spørsmål 2:

Hvilke(n) Ø om noen, disponerende faktor har pasienten for nedre luftveisinfeksjon?

- Høy alder
- Diabetes
- Røyking
- Obstruktiv lungesykdom
- Adipositas

Svar:

Diabetes
Røyking
Adipositas

Spørsmål 3:

Du lurer på om pasienten kan ha en annen bakenforliggende sykdom for sin pneumoni.

Hvilken?

Svar:

Lungekreft

Oppgave: MEDSEM5_NYRE_V13_KONT

Del 1:

61 år gammel kvinne, enke, 2 voksne barn, stressende jobb pga konflikter på arbeidsplassen. 20 % sykemeldt pga dette. Pasienten har hatt høyt blodtrykk i ca 12 år og diabetes type 2 i ca 5 år. Mor hadde også høyt blodtrykk. Hun har ført pølst positiv revmatoid faktor som ble tatt pga ledsmarter. Pga disse smertene har hun de siste årene brukt et NSAID preparat 2-3 ganger i uka. Hun er lite fysisk aktiv, røyker ca 10 sig daglig. Normal vannløftning. Vekt 82 kg, høyde 163 cm.

Du har som hennes fastlege fulgt hennes nyrefunksjon med kreatinin og urinstoff og har observert en gradvis økning i kreatinin fra $97 \mu\text{mol/l}$ i 2010 (referanse verdi $45-90 \mu\text{mol/l}$) til $163 \mu\text{mol/l}$ nå. Urinstoff nå er 7.9 mmol/l ($3.1-7.9 \text{ mmol/l}$), eGFR $28 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$ ($>60 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$), HbA1c 6.9% (4-6%). Normal se-albumin, albumin/kreatinin ratio i urin er 60 mg/mmol . BT $180/80 \text{ mmHg}$. Hun bruker betablokker, ARB (angiotensin-II reseptor-blokker), tiaziddiuretikum, og kalsiumantagonist for høyt blodtrykk, samt metformin for diabetes. Urin stix viser 1+blod, 2+albumin, ved urinmikroskopisk undersøkelse er det normale funn og ikke påvisbare erytrocytter.

Spørsmål 1:

I hvilket stadium av kronisk nyresykdom er pasienten? Begrunn svaret (max 1 linje)

Svar:

Hun er i stadium 4, eGFR = 28.

Spørsmål 2:

Med en albumin/kreatinin ratio (AKR) på 60 mg/mmol vil du da si at:

- Pasienten har mikroalbuminuri
- Pasienten har proteinuri
- AKR på 60 er innenfor det normale

Svar:

Pasienten har proteinuri

Spørsmål 3:

Du konfererer med nefrolog som anbefaler følgende endringer i pasientens medisiner:

- Pasienten bør slutte med NSAID og heller bruke paracetamol som smertestillende
- Legge til ACE-hemmer for bedre nyreprotektiv effekt
- Tiaziddiuretikum seponeres og erstattes med slyngediuretikum
- Nefrologen anbefaler ingen endringer i medisiner nå, men ber deg bestille 24 timers BT før neste kontroll om 2 måneder for se om det er nedsatt
- Pasienten bør slutte med betablokker pga nyresvikten

Svar:

Pasienten bør slutte med NSAID og heller bruke paracetamol som smertestillende
Tiaziddiuretikum seponeres og erstattes med slyngediuretikum

Spørsmål 4:

Hva tenker du kan være den/de mest aktuelle årsak(ene) til hennes nyresykdom ut fra det du nå vet?

- Akutt interstitiell nefritt
- Diabetes nefropati
- IgA-nefritt
- Amyloidose
- Hypertensiv nefrosklerose

Svar:

Diabetes nefropati

Hypertensiv nefrosklerose

Del 2:

61 år gammel kvinne, enke, 2 voksne barn, stressende jobb pga konflikter på arbeidsplassen. 20 % sykemeldt pga dette. Pasienten har hatt høyt blodtrykk i ca 12 år og diabetes type 2 i ca 5 år. Mor hadde også høyt blodtrykk. Hun har fått påvist positiv revmatoid faktor som ble tatt pga leddsmerter. Pga disse smertene har hun de siste årene brukt et NSAID preparat 2-3 ganger i uka. Hun er lite fysisk aktiv, røyker ca 10 sig daglig. Normal vannløftning. Vekt 82 kg, høyde 163 cm.

Du har som hennes fastlege fulgt hennes nyrefunksjon med kreatinin og urinstoff og har observert en gradvis økning i kreatinin fra $97 \mu\text{mol/l}$ i 2010 (referanse verdi $45-90 \mu\text{mol/l}$) til $163 \mu\text{mol/l}$ nå. Urinstoff nå er 7.9 mmol/l ($3.1-7.9 \text{ mmol/l}$), eGFR $28 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$ ($>60 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$), HbA1c 6.9% (4-6%). Normal se-albumin, albumin/kreatinin ratio i urin er 60 mg/mmol . BT $180/80 \text{ mmHg}$. Hun bruker betablokker, ARB (angiotensin-II reseptor-blokker), tiaziddiuretikum, og kalsiumantagonist for høyt blodtrykk, samt metformin for diabetes. Urin stix viser 1+blod, 2+albumin, ved urinmikroskopisk er det normale funn og ikke påvisebare erythrocytter.

Pasienten har en kronisk nyresykdom i stadium 4 og hun har proteinuri, siden albumin/kreatinin ratio i urinen er $> 30 \text{ mg/mmol}$. Du slutter med NSAID fordi pas har hypertensjon og nedsatt nyrefunksjon og bytter ut tiaziddiuretikum med et slyngediuretikum. Tiazider har ikke så god effekt som slyngediuretikum ved nedsatt GFR $< 45 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$

Pasientens nyresykdom er kronisk med langsom prosesjon. Det passer ikke med en akutt interstitiell nefritt. Urin mikro er helt negativ uten hematuri, det passer ikke med IgA-nefritt eller akutt interstitiell nefritt. Ved amyloidose er det som oftest mer proteinuri og det er sjeldnere. Diabetesnefropati og/eller hypertensiv nefrosklerose er de mest sannsynlige tentitive diagnosene.

Spørsmål 1:

Metformin elimineres renalt. Hvordan blir dosen justeres i forhold til dosen før 2010 hvis behandlingen med metformin skal fortsette? Begrunn svaret

Svar:

Dosen må i allfall reduseres, siden metformin skiller ut renalt. Mange vil mene at man skal seponere metformin ved GFR på 28 . Reduere dose og/eller seponere (richtig svar)

Spørsmål 2:

Du henviser til øyelege, hvorfor er det relevant her?

Du spør etter diabetesretinopati fordi det ofte kommer samtidig med diabetesnefropati (begge er mikrovaskulær affeksjon)

Du ønsker om pasienten kan ha papilledem pga blodtrykket

Du vil at pasienten skal undersøkes for grøststørrelse fordi det ofte er assosiert med diabetes nefropati

Svar:

Du spør etter diabetesretinopati fordi det ofte kommer samtidig med diabetesnefropati (begge er mikrovaskulær affeksjon)

Spørsmål 3:

Hva vil du si om pasientens blodtrykk?

For høyt systolisk BT

For høyt systolisk og diastolisk BT

Diastolisk BT skal helst ikke være høyere enn 70 mmHg

BT er greit for en kvinne i hennes alder

For høyt pulstrykk

Svar:

For høyt systolisk BT

For høyt pulstrykk

Spørsmål 4:

Hva heter de to hovedformene for amyloidose man kan få i nyrene? (max 1 linje)

Svar:

De heter AL (primær) og AA (sekundær) amyloidose.

Del 3:

61 år gammel kvinne, enke, 2 voksne barn, stressende jobb pga konflikter på arbeidsplassen. 20 % sykemeldt pga dette. Pasienten har hatt høyt blodtrykk i ca 12 år og diabetes type 2 i ca 5 år. Mor hadde også høyt blodtrykk. Hun har fått påvist positiv revmatoid faktor som ble tatt pga ledsmarter. Pga disse smertene har hun de siste årene brukt et NSAID preparat 2-3 ganger i uka. Hun er lite fysisk aktiv, røyker ca 10 sig daglig. Normal vannløftning. Vekt 82 kg, høyde 163 cm.

Du har som hennes fastlege fulgt hennes nyrefunksjon med kreatinin og urinstoff og har observert en gradvis økning i kreatinin fra $97 \mu\text{mol/l}$ i 2010 (referanse verdi $45-90 \mu\text{mol/l}$) til $163 \mu\text{mol/l}$ nå. Urinstoff nivå er 7.9 mmol/l ($3,1-7,9 \text{ mmol/l}$), eGFR $28 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$ ($>60 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$), HbA1c 6.9% (4-6%). Normal se-albumin, albumin/kreatinin ratio i urin er 60 mg/mmol . BT $180/80 \text{ mmHg}$. Hun bruker betablokker, ARB (angiotensin-II reseptor-blokker), tiaziddiuretikum, og kalsiumantagonist for høyt blodtrykk, samt metformin for diabetes. Urin stix viser 1+blod, 2+albumin, ved urinmikroskop er det normale funn og ikke påvisbare erythrocytter.

Pasienten har en kronisk nyresykdom i stadium 4 og hun har proteinuri, siden albumin/kreatinin ratio i urinen er $> 30 \text{ mg/mmol}$. Du slutter med NSAID fordi pas har hypertensjon og nedsatt nyrefunksjon og bytter ut tiaziddiuretikum med et slyngediuretikum. Tiazider har ikke så god effekt som slyngediuretikum ved nedsatt GFR $< 45 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$. Pasientens nyresykdom er kronisk med langsom prosesjon. Det passer ikke med en akutt interstitiell nefritt. Urin mikro er helt negativ uten hematuri, det passer ikke med IgA-nefritt eller akutt interstitiell nefritt. Ved amyloidose er det som oftest mer proteinuri og det er sjeldnere. Diabetesnefropati og/eller hypertensiv nefrosklerose er de mest sannsynlige tentativa diagnosene.

Pasienten har høyt BT til tross for 4 blodtrykkssenkende medikamenter. Du henviser henne derfor til CT av nyrearterier, pas har klaustrofobi og vil ikke ta MR.

Spørsmål 1:

Hva er det du ser etter med CT nyrearterier hos denne pasienten?

- Cystenyresykdom
- Nyrearteriestenose
- Amyloidose i nyrekarene

Svar:

Nyrearteriestenose

Spørsmål 2:

Når du rekvirerer CT med kontrast hos denne pasienten, hva må du da overveie?

- Fare for alvorlig allergisk reaksjon
- Risiko for kontrastnefropati
- kt proteinuri

Svar:

Risiko for kontrastnefropati

Del 4:

61 år gammel kvinne, enke, 2 voksne barn, stressende jobb pga konflikter på arbeidsplassen. 20 % sykemeldt pga dette. Pasienten har hatt høyt blodtrykk i ca 12 år og diabetes type 2 i ca 5 år. Mor hadde også høyt blodtrykk. Hun har fått påvist positiv revmatoid faktor som ble tatt pga ledsmarter. Pga disse smertene har hun de siste årene brukt et NSAID preparat 2-3 ganger i uka. Hun er lite fysisk aktiv, røyker ca 10 sig daglig. Normal vannløftning. Vekt 82 kg, høyde 163 cm.

Du har som hennes fastlege fulgt hennes nyrefunksjon med kreatinin og urinstoff og har observert en gradvis økning i kreatinin fra $97 \mu\text{mol/l}$ i 2010 (referanse verdi $45-90 \mu\text{mol/l}$) til $163 \mu\text{mol/l}$ nå. Urinstoff nivå er 7.9 mmol/l ($3,1-7,9 \text{ mmol/l}$), eGFR $28 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$ ($>60 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$), HbA1c 6.9% (4-6%). Normal se-albumin, albumin/kreatinin ratio i urin er 60 mg/mmol . BT $180/80 \text{ mmHg}$. Hun bruker betablokker, ARB (angiotensin-II reseptor-blokker), tiaziddiuretikum,

og kalsiumantagonist for høyt blodtrykk, samt metformin for diabetes. Urin stix viser 1+blod, 2+albumin, ved urinmikroskopi er det normale funn og ikke påvisebare erythrocytter. Pasienten har en kronisk nyresykdom i stadium 4 og hun har proteinuri, siden albumin/kreatinin ratio i urinen er > 30 mg/mmol. Du slutter med NSAID fordi pas har hypertensjon og nedsatt nyrefunksjon og bytter ut tiaziddiuretikum med et slyngediuretikum. Tiazider har ikke så god effekt som slyngediuretikum ved nedsatt GFR < 45 ml/min./1.73 m². Pasientens nyresykdom er kronisk med langsom prosesjon. Det passer ikke med en akutt interstitiell nefritt. Urin mikro er helt negativ uten hematuri, det passer ikke med IgA-nefritt eller akutt interstitiell nefritt. Ved amyloidose er det som oftest mer proteinuri og det er sjeldnere. Diabetesnefropati og/eller hypertensiv nefrosklerose er de mest sannsynlige tentativer diagnosene.

Pasienten har høyt BT til tross for 4 blodtrykkssenkende medikamenter. Du henviser henne derfor til CT av nyrearterier, pas har klaustrofobi og vil ikke ta MR.

Du henviser henne til øyelege for å se om det foreligger diabetesretinopati fordi det ofte oppstår parallelt med diabetesnefropati. Pas har betydelig systolisk hypertensjon med høyt pulstrykk hvilket er assosiert med betydelig økt kardiovaskulær risiko og BT målt behandles bedre.

Siden pas har positiv revmatoid faktor, leddsmerter og proteinuri må man også tenke på at hun kan ha amyloidose sekundært til en mulig revmatoid artritt. Det finnes to former for amyloidose; AL amyloidose (primær) og AA amyloidose (sekundær).

Ved behandlingsresistent HT er det riktig å se etter nyrearteriestenose, pas har diabetes og rører hvilket øker risikoen betydelig. Pasienten har høyt BT til tross for 4 blodtrykkssenkende medikamenter. Du henviser henne derfor til CT av nyrearterier. Du overveier risiko for kontrastnefropati fordi hun har redusert GFR.

Pasienten nyrebiopsieres for å finne den nøyaktige diagnosen.

Spørsmål 1:

Hva kan man gjøre for å forebygge kontrastnefropati?

Gi saltvann eller natriumbikarbonat i.v. før og etter u.s.

Be pas drikke store mengder rent vann før u.s.

Gi pas en ekstra dose ARB eller ACE-hemmer for å beskytte nyrene før undersøkelsen

Ingenting, bare la være å gi kontrast

Svar:

Gi saltvann eller natriumbikarbonat i.v. før og etter u.s.

Spørsmål 2:

CT angio viser ingen nyrearteriestenose hos denne pasienten, men hvis den hadde det hvordan kunne den ha blitt behandlet?

Ballongdilatasjon og stent

Ballongdilatasjon, men aldri stent i nyrearterien

Nefrektomi (fjernelse av nyren) på den affiserte side

Svar:

Ballongdilatasjon og stent

Spørsmål 3:

Hvilket av utsagnene under er sant?

Siden hun er kvinne er hjerte-kar risikoen generelt lav

Pas med kronisk nyresykdom før sjeldent hjerte/karsykdom fordi de er naturlig antikoaguleret

Pas med kronisk nyresykdom der som oftest av dialyserelaterte komplikasjoner

Pas med kronisk nyresykdom der som oftest av kardiovaskulær sykdom

Svar:

Pas med kronisk nyresykdom der som oftest av kardiovaskulær sykdom

Del 5:

61 år gammel kvinne, enke, 2 voksne barn, stressende jobb pga konflikter på arbeidsplassen. 20 % sykemeldt pga dette. Pasienten har hatt høyt blodtrykk i ca 12 år og diabetes type 2 i ca 5 år. Mor hadde også høyt blodtrykk. Hun har fått påvist positiv revmatoid faktor som ble tatt pga ledsmarter. Pga disse smertene har hun de siste årene brukt et NSAID preparat 2-3 ganger i uka. Hun er lite fysisk aktiv, røyker ca 10 sig daglig. Normal vannløftning. Vekt 82 kg, høyde 163 cm.

Du har som hennes fastlege fulgt hennes nyrefunksjon med kreatinin og urinstoff og har observert en gradvis økning i kreatinin fra $97 \mu\text{mol/l}$ i 2010 (referanse verdi $45-90 \mu\text{mol/l}$) til $163 \mu\text{mol/l}$ nå. Urinstoff nÅr er 7.9 mmol/l ($3.1-7.9 \text{ mmol/l}$), eGFR $28 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$ ($>60 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$), HbA1c 6.9% (4-6%). Normal se-albumin, albumin/kreatinin ratio i urin er 60 mg/mmol . BT $180/80 \text{ mmHg}$. Hun bruker betablokker, ARB (angiotensin-II reseptor-blokker), tiaziddiuretikum, og kalsiumantagonist for høyt blodtrykk, samt metformin for diabetes. Urin stix viser 1+blod, 2+albumin, ved urinmikroskopisk er det normale funn og ikke påvisbare erytrocytter.

Pasienten har en kronisk nyresykdom i stadium 4 og hun har proteinuri, siden albumin/kreatinin ratio i urinen er $> 30 \text{ mg/mmol}$. Du slutter med NSAID fordi pas har hypertensiøn og nedsatt nyrefunksjon og bytter ut tiaziddiuretikum med et slyngediuretikum. Tiazider har ikke så god effekt som slyngediuretikum ved nedsatt GFR $< 45 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$. Pasientens nyresykdom er kronisk med langsom prosesjon. Det passer ikke med en akutt interstitiell nefritt. Urin mikro er helt negativ uten hematuri, det passer ikke med IgA-nefritt eller akutt interstitiell nefritt. Ved amyloidose er det som oftest mer proteinuri og det er sjeldnere. Diabetesnefropati og/eller hypertensiv nefrosklerose er de mest sannsynlige tentativ diagnosene.

Pasienten har høyt BT til tross for 4 blodtrykksenkende medikamenter. Du henviser henne derfor til CT av nyrearterier, pas har klastrofobi og vil ikke ta MR.

Du henviser henne til øyelege for å se om det foreligger diabetesretinopati fordi det ofte oppstår parallelt med diabetesnefropati. Pas har betydelig systolisk hypertensiøn med høyt pulstrykk hvilket er assosiert med betydelig økt kardiovaskulært risiko og BT målt behandles bedre.

Siden pas har positiv revmatoid faktor, ledsmarter og proteinuri må man også tenke på at hun kan ha amyloidose sekundært til en mulig revmatoid artritt. Det finnes to former for amyloidose; AL amyloidose (primært) og AA amyloidose (sekundært).

Ved behandlingsresistent HT er det riktig å se etter nyrearteriestenose, pas har diabetes og røyker hvilket øker risikoen betydelig. Pasienten har høyt BT til tross for 4 blodtrykksenkende medikamenter. Du henviser henne derfor til CT av nyrearterier. Du overveier risiko for kontrastnefropati fordi hun har redusert GFR. Pasienten nyrebiopsieres for å finne den nærmeste diagnosen.

Ballongdilatasjon og stent er den vanligste behandlingen av aterosklerotisk nyrearteriestenose i tillegg til medikamenter (blodtrykksmedisin, acetylsalisylsyre og kolesterolsenkende medisin). Kontrastnefropati kan forebygges med saltvann eller bikarbonat intravenøst før og etter undersøkelsen. Hos nyrapasienter er det viktig å tenke på fare for overhydrering. Pas med kronisk nyresykdom har høy kardiovaskulær risiko og dør oftest av kardiovaskulær sykdom. Nyrebiopsien viser diabetesnefropati. Hun har ikke nyrearteriestenose viser det seg.

Pasienten spurte deg om du tror hun kommer til å ende med dialyse og nyretransplantasjon.

Spørsmål 1:

Hva svarer du ikke:

Det tror du aldri kommer til å skje

Det er en viss mulighet for det i løpet av de kommende årene

Det avhenger av om hun legger om livsstil, slutter å røyke, begynner å trenere og går ned 10 kg i vekt

Hun kommer til å dø av slag eller hjerteinfarkt lenge før hun får et dialysebehov

Pasienter med diabetesnefropati kan ikke transplanteres

Svar:

Det tror du aldri kommer til å skje

Det avhenger av om hun legger om livsstil, slutter å røyke, begynner å trenere og går ned 10 kg i vekt

Hun kommer til å dø av slag eller hjerteinfarkt lenge før hun får et dialysebehov

Pasienter med diabetesnefropati kan ikke transplanteres

Spørsmål 2:

Hva kan man gjøre for å forsinke utviklingen av hennes diabetesnefropati?

Behandle BT under $140/90 \text{ mmHg}$ eller lavere hvis hun trenger det

FØ pasienten til å slutte å røyke

Redusere proteinuri med økte doser ACE-hemmer eller ARB, hvis pas ellers trenger det

Starte dialyse tidlig

Kontrollere blodsukkeret godt

Gi statiner, ASA og oppfordre pas til fysisk aktivitet

Svar:

Behandle BT under 140/90 mmHg eller lavere hvis hun tøler det
Redusere proteinuri med økte doser ACE-hemmer eller ARB, hvis pas ellers tøler det
Kontrollere blodsukkeret godt

Spørsmål 3:

Hvorfor skal man kontrollere kalsium, fosfat og PTH (parathyroideahormon) regelmessig hos pas med kronisk nyresykdom stadium 3-5? (max 2 linjer)

Svar:

Fordi forstyrrelser i kalsium og fosfat kan føre til renal osteodystrofi (avkalkning av skelettet) og økt kalsifisering av blodårer.

Spørsmål 4:

Kan du nevne et annet viktig hormon som endrer nivå/effekt ved kronisk nyresykdom? (max 1 linje)

Svar:

Erytropoetin

Spørsmål 5:

Forklar kort hva mangel på dette hormonet fører til hos pasienter med kronisk nyresykdom. (max 1 linje)

Svar:

Renal anemi (hypokrom, normokrom anemi)

Spørsmål 6:

Pasienten blir etter hvert som hennes nyresykdom utvikler seg, plaget med generell kløe, du forteller henne at:

Det mest sannsynlige er at det skyldes nyresykdommen og du har behandling tilby
Det er vanlig med kløe når man har diabetes og det er dessverre ikke noe gjøre noe med
Hun mener henvises til hudlege, da hun sannsynligvis har utviklet en allergi
Hun bør seponere ARB som ofte gir kløe

Svar:

Det mest sannsynlige er at det skyldes nyresykdommen og du har behandling tilby

Oppgave: MEDSEM5_THORAX_V13_KONT

Del 1:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har veldig stort ryker siden 16-17 års alder. Han har vært operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 årene hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øtyngdeformasjon i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerte i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspne og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han ikke nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perifert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer.

Spørsmål 1:

Hvilke undersøkelser vil du i første omgang rekvirere i den videre utredning?

- Bronkoskopi
- Mediastinioskopi
- VATS (videoassisteret thorakoskopisk biopsi)
- MR
- CT-thorax
- Nødbiopsi ultralydveiledet
- Nødbiopsi CT-veiledet

Svar:

- Bronkoskopi
- CT-thorax

Spørsmål 2:

Hva er den mest sannsynlige årsaken til at han føler smerte i høyre bein når han går?

- Varicer
- Coxarthrose
- Claudicatio intermittens
- Kneleddsarrose

Svar:

- Claudicatio intermittens

Spørsmål 3:

Hva er de 3 mest sannsynlige årsaker til at han blir tungpustet ved anstrengelse?

- KOLS
- Myokardischemi
- Aortastenose
- Lungekreft
- Generelt dårlig kondisjon
- Diabetes

Svar:

- KOLS
- Myokardischemi
- Lungekreft

Del 2:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har veldig storrøyker siden 16-17 års alder. Han har vært operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 år hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øtyngdeformemmelse i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerter i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspnoe og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han ikke nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perfert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdepunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum. Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Spørsmål 1:

Hva er de 2 første alternativer for å sikre en histologisk diagnose?

- Biopsi/cytologi ved bronkoskopi
- Nærbiopsi/cytologi ved ekstrathorakal ultralyd
- Operasjon med biopsi og frysensnitt
- Thoracoskopisk biopsi
- Transthorakal CT-veiledd biopsi

Svar:

Biopsi/cytologi ved bronkoskopi
Transthorakal CT-veiledd biopsi

Spørsmål 2:

Pasienten kan være suspekt på myokardischemi. Hvilken av uttalelsene nedenfor er riktig dersom pasienten er operasjonskandidat?

- Ingen spesiell hjerteundersøkelse er nødvendig før operasjon
- Det blir tas belastnings EKG
- Det blir først tas ekkokardiografi
- Vil vente med hjerteundersøkelse til etter at pasienten er operert for lungekreft
- Det blir først tas koronar angiografi

Svar:

Det blir tas belastnings EKG

Del 3:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har vært storrøyker siden 16-17 års alder. Han har vært operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 år hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øtyngdeformemmelse i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerter i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspnoe og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han ikke nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perfert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdepunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum. Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Belastnings EKG viser ingen tegn til myokardischemi. CT viser at tumor ikke vokser inn i omliggende strukturer, der er ingen tegn til lymfeknutemetastaser i mediastinum. Cytologi ved bronchoskopi viser ikke-småcellet (sannsynligvis adeno-) carcinoma. Spirometri viser vitalkapasitet på 107 % av forventet, mens FEV1 er 50 % av forventet.

Spørsmål 1:

Hva står FEV1 for? (max 1 linje)

Svar:

Forsert ekspiratorisk volum i ett sekund

Spørsmål 2:

Beskriv hvordan underskelsen utføres (max 2 linjer)

Svar:

Fra maksimal inspiratorisk stilling bløser en ut med maksimal kraft i minst ett sekund. (Vanligvis mæles også FVC samtidig, slik at studentene kan god avslutte med til vedkommende føler at lungene er tomme)

Spørsmål 3:

Hvilken type patologi/lungesykdom tyder pasientens spirometriresultat på?

- Restriktiv lungelidelse
- Obstruktiv lungelidelse
- Hjertesvikt
- Lungekreft

Svar:

Obstruktiv lungelidelse

Spørsmål 4:

Hvilken diagnose tyder spirometrisfunnet på når det sammenholdes med sykehistorien?

- Astma
- Lungefibrose
- KOLS
- Lungekreft
- Hjertesvikt

Svar:

KOLS

Del 4:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har veldig storrøyker siden 16-17 års alder. Han har veldig operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 årene hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øtyngdefornemmelse i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerte i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspnoe og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han på nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perifert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdepunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum. Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Belastnings EKG viser ingen tegn til myokardischemi. CT viser at tumor ikke vokser inn i omliggende strukturer, der er ingen tegn til lymfeknutemetastaser i mediastinum. Cytologi ved bronchoskop viser ikke-småcellet (sannsynligvis adeno-) carcinoma. Spirometri viser vitalkapasitet på 107 % av forventet, mens FEV1 er 50 % av forventet.

Til tross for at pasienten har KOLS med nedsatt lungefunksjon oppfattes han som operabel

Spørsmål 1:

Hvorfor skal pasienten opereres i stedet for å få cellegift og stråling?

Svar:

Operasjon med fjernelse av alt cancerlev gir klart størst mulighet for helbredelse

Spørsmål 2:

Hvilken operasjon skal mest sannsynlig utføres hos denne pasienten?

Pneumonektomi venstre side

Kileeksjon av tumor med omgivende vev (en del av venstre underlapp)

Lobectomi venstre underlapp

Svar:

Lobectomi venstre underlapp

Spørsmål 3:

Hva er en dobbel lumen tube? Hvorfor brukes den ofte ved operasjoner for lungekreft? (max 3 linjer)

Svar:

Ved dobbel lumen tube kan de to lungene ventileres separat. Det er derfor mulig å stoppe ventilasjonen i den lungen man operer på for "å komme bedre til", lungen faller da sammen.

Del 5:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har veldig stor ryker siden 16-17 års alder. Han har også operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 årene hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øyngdeformasjon i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerte i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspnoe og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han på nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perifert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdpunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum. Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Belastnings EKG viser ingen tegn til myokardischemi. CT viser at tumor ikke vokser inn i omliggende strukturer, der er ingen tegn til lymfeknutemetastaser i mediastinum. Cytologi ved bronchoskopi viser ikke-smäcellet (sannsynligvis adeno-) carcinoma. Spirometri viser vitalkapasitet på 107 % av forventet, mens FEV1 er 50 % av forventet.

Til tross for at pasienten har KOLS med nedsatt lungefunksjon oppfattes han som operabel.

Ved operasjonen fjernes venstre underlapp, det er ikke tegn til noen spredning av cancer. Det legges inn 2 dren i venstre pleura tilkoplet sug, postoperativt lekker det en del luft på drenene. Han har i forbindelse med operasjonen fått et epiduralkateter som han beholder postoperativt.

Spørsmål 1:

Hva mener vi når vi sier at dren har en dobbelfunksjon, den er både terapeutisk og diagnostisk? (max 2 linjer)

Svar:

De gir informasjon om hvor mye (diagnostisk) som kommer ut (luft og/eller væske) og fjerner det (terapeutisk).

Spørsmål 2:

Når skal thoraxdrenene fjernes?

2. dag etter operasjonen

Når det har sluttet å lekke luft

Ulike dager avhengig av avdelingens rutine

Når der kun er litt/minimal vaskeskelekkasje på drenene

Når det har sluttet å lekke luft og det kun er litt/minimal vaskeskelekkasje på drenene

Svar:

Når det har sluttet å lekke luft og det kun er litt/minimal vaskeskelekkasje på drenene

Spørsmål 3:

Hvorfor har pasienten postoperativt et epiduralkateter?

I tilfelle det er nødvendig å foreta noe kirurgisk i det postoperative forløp pga komplikasjoner

Gi beroligende medikamenter

Gi smertestillende

En generell inngang for å gi medikamenter og eventuelt vaskeske

Svar:

Gi smertestillende

Del 6:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har vært storrøyker siden 16-17 års alder. Han har vært operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 årene hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved lettere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øtyngdeformemmelser i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smarer i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspnoe og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han på nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perifert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdepunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum.

Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Belastnings EKG viser ingen tegn til myokardischemi. CT viser at tumor ikke vokser inn i omliggende strukturer, der er ingen tegn til lymfeknutemetastaser i mediastinum. Cytologi ved bronchoskopi viser ikke-småcellet (sannsynligvis adeno-) carcinoma. Spirometri viser vitalkapasitet på 107 % av forventet, mens FEV1 er 50 % av forventet.

Til tross for at pasienten har KOLS med nedsatt lungefunksjon oppfattes han som operabel.

Ved operasjonen fjernes venstre underlapp, det er ikke tegn til noen spredning av cancer. Det legges inn 2 dren i venstre pleura tilkoplet sug, postoperativt lekker det en del luft på drenene. Han har i forbindelse med operasjonen fått et epiduralkateter som han beholder postoperativt.

3. postoperative dag er det slutt på luftlekkasje og drenene fjernes. Samtidig fjernes epiduralkateteret.

Pasienten spiser og er oppgittende, men har en hel del smarer i venstre side, spesielt ved bevegelser og når han hoster. Han har en hel del ekspektorat. Dagen etter fjernelse av dren viser rtg. thorax at det er en moderat mengde vaskeske i venstre pleura. Samtidig har han en temperatur på 38.5 (dagene før har han vært afebril).

Spørsmål 1:

Morfín og morfinderivater er hostedempende. Postoperativt (spesielt ved operasjoner i thorax og abdomen) sier vi ofte at slike medikamenter kan være hostefremmende. Hvorfor?

Svar:

Hoste er smertefullt ved denne type operasjoner, ved å redusere/ta bort smerten kan pasienten hoste kraftigere.

Spørsmål 2:

Hva er de 2 mest sannsynlige grunner til at denne pasienten har mye ekspektorat?

KOLS

Følge av lungekreft

Har hatt full narkose og vært intubert

Emfysem
Fordi han har pleurav^{3/4}ske

Svar:
KOLS
Har hatt full narkose og v^{3/4}rt intubert

Spørsmål 3:

Hva er generelt de 3 hyppigste årsaker/lokalisasjoner til infeksjon etter større operasjoner?

Svar:
Særinfeksjon, pneumoni og urinvegsinfeksjon.

Del 7:

Pasienten er en mann, 61 år gammel. Han arbeider i kommuneadminstrasjonen, stillesittende arbeid, 176 cm, 86 kg. Han har v^{3/4}rt storrøyer siden 16-17 års alder. Han har v^{3/4}rt operert for lyskebrokk og for coxarthrose i venstre hofte. Han har de siste 5 årene hatt en diabetes som behandles med diett og medikamenter. I den senere tid blir han tungpustet ved letttere til moderat anstrengelse. Han har store varicer i høyre underekstremitet, synes der er ofte en viss øytingdeformasjon i benet. Ingen brystsmerter ved anstrengelse, men han føler smerte i høyre underekstremitet når han går ca 3-400 meter samtidig med at han føler dyspne og i blant også brystsmerter. Smertene i benet og i brystet går over ved hvile. I forbindelse med at han på nytt skal opereres for lyskebrokk gjøres et rtg. thorax, man finner forandringer noe perifert i venstre underlapp som gir mistanke om lungecancer

CT thorax med kontrast viser at fortetningen har en diameter ca 3 cm som gir mistanke om primær lungecancer. Det er ikke holdepunkter for spredning til lever eller binyrer og det er ingen forstørrede lymfeknuter i mediastinum. Fortetningen sitter lateralt i underlappen ca. 3cm fra pleura.

Belastnings EKG viser ingen tegn til myokardischemi. CT viser at tumor ikke vokser inn i omliggende strukturer, der er ingen tegn til lymfeknutemetastaser i mediastinum. Cytologi ved bronchoskopi viser ikke-småcellet (sannsynligvis adeno-) carcinom. Spirometri viser vitalkapasitet på 107 % av forventet, mens FEV1 er 50 % av forventet. Til tross for at pasienten har KOLS med nedsatt lungefunksjon oppfattes han som operabel.

Ved operasjonen fjernes venstre underlapp, det er ikke tegn til noen spredning av cancer. Det legges inn 2 dren i venstre pleura tilkoplet sug, postoperativt lekker det en del luft på drenene. Han har i forbindelse med operasjonen fått et epiduralkateter som han beholder postoperativt.

3. postoperative dag er det slutt på luftlekkasje og drenene fjernes. Samtidig fjernes epiduralkateteret. Pasienten spiser og er oppgittende, men har en hel del smerte i ve side, spesielt ved bevegelser og når han hoster. Han har en hel del ekspektorat. Dagen etter fjernelse av dren viser rtg. thorax at det er en moderat mengde v^{3/4}ske i venstre pleura. Samtidig har han en temperatur på 38.5 (dagene før har han v^{3/4}rt afebril).

Pasienten har en pneumoni og det startes behandling med antibiotika. Han har helt siden operasjonen fått behandling med lavmolekylært heparin. Pleurav^{3/4}sken blir tappet. Han er i ganske god almenntilstand.

Spørsmål 1:

Dersom man tenker på andre muligheter til infeksjon hos denne pasienten (andre enn de 3 i spørsmål 3) med bakgrunn i sykehistorien, hvilken er mest sannsynlig?

- Sepsis
- Infeksjon etter epidural kateter
- Endokarditt
- Pleuraempyem

Svar:

Pleuraempyem

Spørsmål 2:

Hva vil du gjøre med pleurav^{3/4}sken som ble tappet?

- Ta ny cytologisk prøve
- Analysere på proteininnhold
- Ikke nødvendig å gjøre noe, kaste i vasken. Histologisk diagnose er allerede sikret.
- Måle pH

Ta vare på pleuravæsken i tilfelle et behov kan oppstå i denne tiden fremtid

Svar:

Møle pH

Spørsmål 3:

Hvorfor fikk pasienten lavmolekylert heparin postoperativt? (2 riktige)

- Hindre utvikling av atheromatose
- Hindre dyp venetrombose
- Bedre sirkulasjonen i gjenværende lungevev
- Hindre arterieembolier
- Motvirke endokarditt
- Hindre lungeembolisme

Svar:

Hindre dyp venetrombose
Hindre lungeembolisme

Spørsmål 4:

Etter en vellykket (dvs. radikal fjernelse av alt cancernev) operasjon for lungekreft, hva tror du er sjansene for at pasienten (som ikke slutter å røyke) kan utvikle en ny primær cancer i lungene?

- Samme som "normalbefolkningen"
- Mindre enn "normalbefolkningen"
- Høyere enn "normalbefolkningen"

Svar:

Høyere enn "normalbefolkningen"

Oppgave: MEDSEM5_TRAUME_V13_KONT

Del 1:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er v ken og kan svare p  tiltale, men klager over betydelige smarer i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens p  32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smarer over venstre thoraxhalvdel.

Sp rsm l 1:

Hva betyr ABC ved den initiale evaluering av en traumepasient? Hva ligger i ABC evalueringen, forklar hva som ligger bak bokstavene?

Svar:

A=frie luftveier (  skrive bare "airways" gir bare 50%), B=Pasienten puster, evaluere respirasjonsstatus (bare skrive "breathing" gir bare 50%), C=sirkulatorisk status (bare skrive "circulation" gir bare 50%)

Sp rsm l 2:

Hva er det f rste du tenker p  som  rsak til hennes thoraxsmerter?

- Pneumothorax
- Hjerteinfarkt
- Ribbensbrudd
- Muskelsmerter, myalgier
- Lungekontusjon

Svar:

Ribbensbrudd

Sp rsm l 3:

I de f rste 5 minutter etter adkomst vil du utf re 2 unders kelser i tillegg til klinisk unders kelse for   kartlegge thorax og respirasjon. Hvilke?

Svar:

1. Rtg.thorax, 2. Blodgass

Sp rsm l 4:

Hva tror du er den mest sannsynlige  rsak til lavt blodtrykk hos denne pasienten?

- Hjertesvikt
- Lungeemboli
- Bl dning
- Hjerteinfarkt
- Hjertetamponade
- Septisk sjokk

Svar:

Bl dning

Sp rsm l 5:

Hva er det f rste du vil gj re helt umiddelbart for   sikre eller bedre tilstanden hos denne pasient? (To svar er riktig)

Utfør CT av thorax
Gi oksygen
Legge inn venflon og gi v^{3/4}ske
Utfør CT av hodet
Legge inn thoraxdren
Legge inn bl^{3/4}rekateter
Gjøre ekkoundersökelse av hjertet

Svar:

Gi oksygen
Legge inn venflon og gi v^{3/4}ske

Del 2:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er veken og kan svare på tiltale, men klager over betydelige smerter i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens på 32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smerter over venstre thoraxhalvdel.

Hun får oksygen på maske, det legges inn 2 grove venflon og hun får v^{3/4}ske. Rtg. Thorax er tatt. Palpasjon over venstre thoraxhalvdel gir mistanke om 5-6 costafrakturer.

Spørsmål 1:

Hva er de 3 vanligste intrathorakale komplikasjoner/skader som opptrer ved større thoraxskader, spesielt i forbindelse med costafrakturer? (1 linje)

Svar:

Pneumothorax, hemothorax, lungekontusjon

Spørsmål 2:

Hva er flail chest og hva fører det til (=hva er konsekvensene)? (max 3 linjer)

Svar:

Flere ribber er brukket på 2 steder (a) slik at et segment av thoraxveggen er løs og har paradoksal bevegelse (b) ved respirasjonen. Dette øker respirasjonsarbeidet (c) og gir anstrengt respirasjon (d). Alle punktene (a)-(d) må være med for å gi fullt hus.

Spørsmål 3:

Hvordan behandles vanligvis multiple costafrakturer hos en (multi)traumepasient som er veken?

Gi surstoff på maske
Legge inn thoraxdren
Operasjon med fiksering av frakturene
Gi symptomatisk behandling (oksygen, støtte respirasjonen, smertestillende, etc.)
Smertestillende med epidural kateter
Respiratorbehandling

Svar:

Gi symptomatisk behandling (oksygen, støtte respirasjonen, smertestillende, etc.)

Del 3:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er vaken og kan svare på tiltale, men klager over betydelige smerter i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens på 32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smerter over venstre thoraxhalvdel.

Hun får oksygen på maske, det legges inn 2 grove venflon og hun får vasko. Rtg. Thorax er tatt. Palpasjon over venstre thoraxhalvdel gir mistanke om 5-6 costafrakturer.

Rtg thorax viser diverse fortetninger i venstre lunge som er delvis sammenfallet. Der er pneumothorax med luftkappe på 4-5 cm og betydelig øsløring tilsvarende til vasko i venstre pleura. Moderat forskyvning av mediastinum mot høyre. Samtidig ses halsvenestuvning.

Spørsmål 1:

Hva er den direkte konsekvens av røntgenbildet?

- Utføre ekkokardiografi av hjertet
- Ta ny blodgass
- Legge inn thoraxdren
- Ta CT av thorax
- Operasjon

Svar:

Legge inn thoraxdren

Spørsmål 2:

Hva er kan halsvenestuvning hos denne pasienten mest sannsynlig være et tegn på eller forårsaket av? Gi to alternative årsaker/diagnoser

Svar:

Hjertesvikt, forårsaket enten trykkpneumothorax eller hjertetamponade. • skrive bare hjertesvikt gir bare 1 poeng.

Del 4:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er vaken og kan svare på tiltale, men klager over betydelige smerter i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens på 32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smerter over venstre thoraxhalvdel.

Hun får oksygen på maske, det legges inn 2 grove venflon og hun får vasko. Rtg. Thorax er tatt. Palpasjon over venstre thoraxhalvdel gir mistanke om 5-6 costafrakturer.

Rtg thorax viser diverse fortetninger i venstre lunge som er delvis sammenfallet. Der er pneumothorax med luftkappe på 4-5 cm og betydelig øsløring tilsvarende til vasko i venstre pleura. Moderat forskyvning av mediastinum mot høyre. Samtidig ses halsvenestuvning.

Rtg. bildet viste også multiple (minst 5) ribbefrakturer på venstre side, 4 av disse er brukket på 2 steder. I tillegg er der sternumfraktur. Det legges inn et thoraxdren på venstre side, det tømmer seg straks 800 ml blod. Samtidig betydelig luftlekkasje på drenet. Nesten umiddelbart etter innleggelse av dren bedrer sirkulasjonen seg, blodtrykket øker til 110/60 og halsvenestuvningen blir borte (trykkpneumothorax!). Etter ca 10 minutter er imidlertid blodtrykket 90/55 (men ingen sikker halsvenestuvning). Ekko viser en øtomt hjerteø som ved hypovolemi, men med tydelig hypokinesi i framveggen av venstre ventrikkel og i septum. Ingen vasko i pericard.

Spørsmål 1:

Hva tror du er sannsynlig årsak til hypokinesi i ventriklen?

- Hjertekontusjon
- Infarkt
- Hjertetamponade
- Myokardischemi

Flail chest
Gjennomgått trykkpneumothorax

Svar:

Hjertekontusjon

Spørsmål 2:

Hvilket annet funn styrker denne diagnosen?

- Flail chest
- Multiple costafrekutter
- Sternumfraktur
- Lungekontusjon
- Trykkpneumothorax

Svar:

Sternumfraktur

Spørsmål 3:

Hvilke undersøkelser vil du gjøre først for å komme videre til diagnose av årsaken til hypokinesi i ventriklen?

- Coronar angiografi
- CT av thorax
- EKG
- Ta markører for myokardskade (markører som ved infarkt), troponin I eller T, CK-MB
- Ta nytt ekko etter at pasienten har fått mer vaskulær

Svar:

EKG

Ta markører for myokardskade (markører som ved infarkt), troponin I eller T, CK-MB

Del 5:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er vaken og kan svare på tiltale, men klager over betydelige smerter i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens på 32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smerter over venstre thoraxhalvdel.

Hun får oksygen på maske, det legges inn 2 grove venflon og hun får vaskulær. Rtg. Thorax er tatt. Palpasjon over venstre thoraxhalvdel gir mistanke om 5-6 costafrekutter.

Rtg thorax viser diverse fortetninger i venstre lunge som er delvis sammenfallet. Der er pneumothorax med luftkappe på 4-5 cm og betydelig øsløring svarende til vaskulær i venstre pleura. Moderat forskyvning av mediastinum mot høyre. Samtidig ses halsvenestuvning.

Rtg. bildet viste også multiple (minst 5) ribbefrekutter på venstre side, 4 av disse er brukket på 2 steder. I tillegg er der sternumfraktur. Det legges inn et thoraxdren på venstre side, det tømmer seg straks 800 ml blod. Samtidig betydelig luftlekkasje på drenet. Nesten umiddelbart etter innleggelse av dren bedrer sirkulasjonen seg, blodtrykket øker til 110/60 og halsvenestuvningen blir borte (trykkpneumothorax!). Etter ca 10 minutter er imidlertid blodtrykket 90/55 (men ingen sikker halsvenestuvning). Ekko viser en øtomt hjerte som ved hypovolemi, men med tydelig hypokinesi i framveggen av venstre ventrikkel og i septum. Ingen vaskulær i pericard.

Et nytt rtg. thorax viser at der ikke er nesten ingen vaskulær i pleura og der en kun en minimal pneumothoraxkappe apikalt. Der er imidlertid synlige fortetninger i lungeparenkymet. Med 10 liter oksygen på maske blir pasienten tiltagende anstrengt i respirasjonen, tydelig dyspne og bruk av aksessoriske respirasjonsmuskler.

Spørsmål 1:

Hvordan vil du behandle pasientens respirasjonsproblemer?

Gi mer oksygen

Intubere og legge på respirator
Gi CPAP
Avvente og se om det bedrer seg
Legge inn enda et thoraxdren for ytterligere å redusere vaskse i pleura og pneumothorax

Svar:

Intubere og legge på respirator

Spørsmål 2:

Hva tror du er de 3 mest sannsynlige årsaker til pasientens respirasjonsproblemer? (1 linje)

Svar:

1. Lungekontusjon, 2. Flail chest, 3. Multiple costafrakturer.

Del 6:

En 30 år gammel tidligere frisk kvinne kommer til sykehus ca 30 minutter etter at hun var forsetepassasjer i en bil som hadde front til front kollisjon. Hun er vaken og kan svare på tiltale, men klager over betydelige smerter i venstre side av thorax. Hun har tydelig anstrengt respirasjon med en respirasjonsfrekvens på 32. Blodtrykk er 90/55, puls 120 regelmessig. Hun er blek og kaldsvettende. Ved palpasjon og kompresjon av thorax har hun sterke smerter over venstre thoraxhalvdel.

Hun får oksygen på maske, det legges inn 2 grove venflon og hun får vaskse. Rtg. Thorax er tatt. Palpasjon over venstre thoraxhalvdel gir mistanke om 5-6 costafrakturer.

Rtg thorax viser diverse fortetninger i venstre lunge som er delvis sammenfallet. Der er pneumothorax med luftkappe på 4-5 cm og betydelig åsløring svarende til vaskse i venstre pleura. Moderat forskyvning av mediastinum mot høyre. Samtidig ses halsvenestuvning.

Rtg. bildet viste også multiple (minst 5) ribbefrakturer på venstre side, 4 av disse er brukket på 2 steder. I tillegg er der sternumfraktur. Det legges inn et thoraxdren på venstre side, det tømmer seg straks 800 ml blod. Samtidig betydelig luftlekkasje på drenet. Nesten umiddelbart etter innleggelse av dren bedrer sirkulasjonen seg, blodtrykket øker til 110/60 og halsvenestuvningen blir borte (trykpkpneumothorax!). Etter ca 10 minutter er imidlertid blodtrykket 90/55 (men ingen sikker halsvenestuvning). Ekko viser en tömt hjerte som ved hypovolemi, men med tydelig hypokinesi i framveggen av venstre ventrikkel og i septum. Ingen vaskse i pericard.

Et nytt rtg. thorax viser at der ikke er nesten ingen vaskse i pleura og der en kun en minimal pneumothoraxkappe apikalt. Der er imidlertid økende fortetninger i lungeparenkymet. Med 10 liter oksygen på maske blir pasienten tiltagende anstrengt i respirasjonen, tydelig dyspne og bruk av aksessoriske respirasjonsmusklene.

Pasienten har altså hjertekontusjon, multiple costafrakturer, flail chest og lungekontusjon (samtid pneumothorax og hemotorax som er drenbehandlet). Blodtrykket er fortsatt lavt (90/55) til tross for at pasienten får kontinuerlig transfusjon av betydelige mengder vaskse.

Spørsmål 1:

Hvorfor er antallet ribbefrakturer av interesse?

- Gir informasjon om smertenivået
- Er av betydning for senkomplikasjoner
- Gir opplysninger om den energi som er påført ved traumet
- Gir opplysninger om mulighet for intrathorakale skader
- Er indikasjon for epiduralkateter

Svar:

Gir opplysninger om den energi som er påført ved traumet
Gir opplysninger om mulighet for intrathorakale skader

Spørsmål 2:

Er rtg. thorax en god undersøkelse for å bestemme antall ribber som er brukket? Grunngi svaret kort. (max 3 linjer)

Svar:

Rtg. thorax viser ikke hele ribbens forløp. Deler av ribbene med frakturer behøver ikke ses. Viser et

rtg.thorax multiple ribbefrakturer, kan der gjerne vise flere.

Spørsmål 3:

Hva er lungekontusjon?

- Blodning i lungeparenkymet
- Lokalisert/regionalt ødem i lunget
- Atlektaser
- Knusning av lungevev
- Luftveger som er blokkert av slim eller blod

Svar:

Knusning av lungevev

Spørsmål 4:

Hva er mekanismen bak lavt PaO₂ ved lungekontusjon? Forklar hva som hender/forårsaker dette? (max 2 linjer)

Svar:

Intrapulmonell shunting, blodet passerer lungevev som ikke er ventilert og blir dermed ikke oksygentert (=venøs blandning)

Spørsmål 5:

Bedømt ut fra blodtrykk og transfusjonsbehov er det holdepunkter for at pasienten blir fra et sted. Hvor er det mest sannsynlig (= hyppigst forekommende) at dette er?

- Hode
- Thorax
- Bekken
- Ekstremiteter
- Abdomen

Svar:

Abdomen

Spørsmål 6:

Kvinnen er 174 høy og veier 65 kg. Det har ikke gått ca 30 minutter etter innkomst til sykehus. Hvilket tall nedenfor beskriver sannsynligvis best hennes timediurese på det nærværende tidspunkt?

- 140 ml
- 20 ml
- 65 ml
- 500 ml

Svar:

20 ml